

Pérdida de peso: las ventajas de formoline L112

formoline
L112

Adsorbente de lípidos como ayuda en:

- El tratamiento del sobrepeso
- El control del peso a largo plazo
- La reducción de la absorción del colesterol de los alimentos

Puntos fuertes del producto


- Producto No. 1* para adelgazar en Alemania
- Ganador de numerosos premios y galardones
- Comercializado con éxito en más de 40 países en todo el mundo
- Alta tolerabilidad y mínimos efectos secundarios
- Dispositivo Médico clase III certificado por un organismo designado



*A.C. Nielsen „Top Marken Diätetika 2013, solo formas farmacéuticas de administración oral“

**Premios traducidos al español: "Schlankheitsmittel des Jahres 2017", "Schlankheitsmittel des Jahres 2015", "Schlankheitsmittel des Jahres 2013", "Schlankheitsmittel des Jahres 2012", "Schlankheitsmittel des Jahres 2011", "Schlankheitsmittel des Jahres 2010", "Schlankheitsmittel des Jahres 2009", "Schlankheitsmittel des Jahres 2008", "Schlankheitsmittel des Jahres 2007".

Reducción de la absorción de lípidos en sangre de hasta un 66 %



Lípidos de grasas alimentarias en el plasma sanguíneo con y sin formoline L112.

La disminución de la asimilación de calorías de grasas alimentarias se ha podido confirmar en un estudio «in vivo» controlado contra placebo. El estudio fue llevado a cabo con dos grupos de tratamiento en paralelo, cada uno de ellos formado por 6 hembras adultas de minicerdo Göttingen. Uno de los grupos se utilizó como grupo placebo sin tratamiento (control), y al otro grupo se le administraron previamente 2 comprimidos de 500 mg de formoline L112.

Cnubben N.H.P. et al. (2016): A single oral dose of a polyglucosamine influences the bioavailability of [9-14C]-Oleic acid in adult female Göttingen minipigs. BMC Obesity 3(1):1-12.

Parámetros de obesidad después de 4 meses

En un estudio de «doble ciego» controlado contra placebo, se administró a un total de 60 personas con ligero sobrepeso (IMC 26–30 kg/m²) e hiperlipidemia recibieron una preparación de poliglucosamina o un placebo combinados con una actividad física adecuada. Los resultados permitieron confirmar que la administración de poliglucosamina asociada con una actividad física complementaria permite reducir significativamente el peso corporal y tiene un efecto positivo en síndromes metabólicos preexistentes.

Cornelli U. et al. (2008): Use of polyglucosamine and physical activity to reduce body weight and dyslipidemia in moderately overweight subjects. Minerva Cardioangiologica 56(5 Suppl 1): 71 – 78.

